

Palliative Reservemedikation[©]

Die aktuelle Medikation wurde geprüft und unnötige Medikamente abgesetzt: Ja Nein

Aktuelle Medikamentenliste im Anhang: Ja Nein

Namen des Patienten: _____

Visum/ Dat. Arzt*	Reservemedikation in der Palliativsituation				Stop/ Visum Arzt
	Schmerz	Übliche Dosierung	Innerhalb von 24 Stunden	Anmerkungen	
	<input type="checkbox"/> Morphin Lösung 2% (1 Tropfen = 1 mg)	2–5 Trpf.	bis 1 stündlich		
	<input type="checkbox"/> Morphin Amp. (10 mg / 1 ml)	1–2.5 mg sc	bis 1 stündlich		
	<input type="checkbox"/> Mind. 1/10 der bisherigen Tagesdosis bei Vorbehandlung mit Opiaten		X		
	<input type="checkbox"/> anderes				
	Angst				
	<input type="checkbox"/> Temesta Exp 1.0 mg	1 mg	bis 1 stündlich bis max. 8/d		
	<input type="checkbox"/> Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml)	0.5 – 1 mg sc	bis 1 stündlich		
	<input type="checkbox"/> anderes				
	Unruhe und/oder Delir				
	<input type="checkbox"/> Haldol Trpf. 2 mg / 1 ml (10 Tropfen = 1 mg)	3–5 Trpf.	bis 1 stündlich max. 6/d		
	<input type="checkbox"/> Haldol Amp. (5 mg / 1 ml)	0.5 mg sc (0.1 ml)	bis 1 stündlich max. 6/d		
	<input type="checkbox"/> Bei massiver Unruhe, Agitiertheit 3 Dosen Haldol, dann 1 Dosis Benzodiazepine (Temesta od. Dormicum)				
	<input type="checkbox"/> anderes				
	Atemnot				
	<input type="checkbox"/> Morphin Lösung 2% (1 Tropfen = 1 mg)	2–5 Trpf.	bis alle 20 Min.		
	<input type="checkbox"/> Morphin Amp. (10 mg / 1 ml)	1–2.5 mg sc	bis alle 20 Min.		
	<input type="checkbox"/> Temesta Exp 1.0 mg	1 mg	bis 1 stündlich max. 8/d		
	<input type="checkbox"/> Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml)	1 mg sc	bis alle 20 Min.		
	<input type="checkbox"/> anderes				
	Rasselatmung				
	<input type="checkbox"/> Buscopan Amp. (20 mg / 1 ml)	20 mg sc	bis max. 6/d		
	<input type="checkbox"/> anderes				

Übelkeit / Erbrechen				
<input type="checkbox"/>	Motilium lingual 10 mg	1 Tbl.	bis max. 3/d	
<input type="checkbox"/>	Paspertin Trpf. (30 Trpf. = 10 mg)	30 Trpf.	bis 6/d	
<input type="checkbox"/>	Paspertin Amp. (10 mg / 2 ml)	10 mg sc	bis 6/d	
<input type="checkbox"/>	Haldol Trpf. 2 mg / 1 ml (10 Tropfen = 1 mg)	3–5 Trpf.	bis 6/d	
<input type="checkbox"/>	Haldol Amp. (5 mg / 1 ml)	0.5 mg sc	bis 6/d	
<input type="checkbox"/>	anderes			
Epileptische Anfälle / Status epilepticus				
<input type="checkbox"/>	Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml)	1 mg sc	Nach 30–60 Min. max. 2/d	
<input type="checkbox"/>	anderes			

Quelle: Palliativzentrum KSSG

Erreichbarkeit mit Arzt ist abgeklärt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Mobile-Nr.
Datum	Unterschrift Arzt	
Behandelnder Arzt		
Verordnender Arzt		

* Dieser Plan kann als Ganzes, in einzelnen Abschnitten oder in jeder Zeile einzeln unterschrieben werden.
Eine neuer Plan kann unter: www.palliative-ostschweiz.ch heruntergeladen werden.

Mitglieder der Arbeitsgruppe:

Dr. med. Charlotte Bigler, Hausärztin

Jeannette Brändle, Pflegefachfrau DN1

Dr. med. Daniel Büche, MSc, Innere Medizin, Palliativmedizin

Barbara Grossenbacher-Gschwend, dipl. Pflegefachfrau und Ausbilderin FA

Dr. med. Esther Henzi, Hausärztin

Dr. med. Roman Inauen, Facharzt Onkologie, Innere Medizin, Palliativmedizin (Leitung der AG)

Myrta Keiser, Dipl. Pflegefachfrau HF

Dr. med. Thomas Langer, Hausarzt

Katharina Linsi, Leiterin Geschäftsstelle palliative ostschweiz

Dr. med. Christine Luginbühl, Aertzin Allgemeinmedizin

Petra Neff, Leiterin Palliative Plus

Renate Praxmarer, Co-Leitung Pall. Brückendienst SG AR AI

Dr. med. Marianne Rechsteiner, Hausärztin

Urheberrechte:

Grundsätzliche Änderungen im Dokument Palliative Reservemedikation® nur nach Rücksprache mit palliative ostschweiz.

Anpassungen von Dosierung, Häufigkeit und weiteren variablen Angaben sind davon ausgenommen.

(Felder sind zur Änderung freigeschaltet)